AGRO**Q-TRAL**

Protegiendo y estimulando la vida

CROP COVER® SL

Bioestimulante microbiano

CROP COVER SL es un bioestimulante microbiano, compuesto por 3 cepas bacterianas del género *Bacillus*. Su alta capacidad de cobertura permite que su acción se prolongue sobre la fruta o el tejido vegetal durante el periodo de almacenamiento y tránsito, generando un rápido desarrollo al momento de enfrentarse a las condiciones de anaquel y colonizando el tejido.

Producto concentrado: 3 x 10^{10} UFC/ml

Composición:	**UFC/ml**
Bacillus amyloliquefaciens cepa CQ 87	1,0 x 10^{10}
Bacillus subtilis cepa CQ 78	1,0 x 10^{10}
Bacillus subtilis cepa CQ 74	1,0 x 10^{10}
Coformulantes c.s.p.	99,7%

Contaminante	**Valor (ppm)**
Cromo hexavalente	<2
Cadmio	<1,5
Arsénico	<40
Plomo	<120
Mercurio	<1
Níquel	<50
Cobre	<600
Zinc	<1500
Escherichia coli	Ausente
Salmonella sp.	Ausente

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS:
pH dilución 10% (20°C): 6,67
Densidad (20°C): 1,0185 g/L

Fabricante/Formulador: AGRO Q-TRAL SpA
Dirección: San Isidro P38, Quillota, Chile
Página web: www.aqt.cl

Contenido: 1 litro

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

USOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Precosecha (near harvest) de uva de mesa, berries, hortalizas de fruto y flores	1 L/ha ó 100 cc/hL para mojamientos menores a 1.000 L.	Aplicar de manera foliar, previo a los momentos de cosecha, procurando cubrir la totalidad de la fruta, hortaliza y /o flor.
Frutas en plantas de proceso, arándanos, paltos, cítricos, mango, nectarines, duraznos y manzana.	4 a 6 cc/L de agua según volumen de gasto de la máquina.	Aplicar por pulverización o con máquina electrostática sobre la fruta previo al embalaje.

MODO DE APLICACIÓN: agitar el envase antes de tomar la dosis a aplicar, agregar al estanque de fertirriego, el cual debe estar con agua hasta la mitad y con el agitador en funcionamiento, para asegurar la homogeneidad de la mezcla.

COMPATIBILIDAD: CROP COVER® SL es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común, pero no compatible con productos clorados ni cúpricos.

FITOTOXICIDAD: no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

TIEMPO DE REINGRESO: sin restricción.

PRECAUCIONES: temperatura de almacenamiento entre 5 y 15°C. Conservar a la sombra, en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, su contenido debe ser utilizado completo.

DURACIÓN: 6 meses a contar de la fecha de fabricación.

ADVERTENCIAS: producto natural, no contaminante. No es corrosivo y puede ser aplicado con equipos convencionales. Usar una vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del producto. Evite el contacto con los ojos y piel.

NOTA AL COMPRADOR: el producto y su formulación ha sido realizada bajo estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos la concentración en los envases debidamente sellados. El almacenamiento y la aplicación, son de exclusiva responsabilidad del usuario.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: AGRO Q-TRAL +56942472555/ +56979762095. En horarios de oficina.