



TRIBAC BIO es un producto formulado en base a esporas y micelio activo de 6 cepas microbianas de los géneros *Bacillus* y *Trichoderma*, que actúan a nivel de suelo y foliar, como agente inoculante y bioestimulante de plantas.

Producto concentrado: 1×10^9 UFC/ml

Composición:	UFC/ml	Contaminante	Valor (ppm)
<i>Trichoderma virens</i> cepa QT 17	$2,0 \times 10^8$	Cromo hexavalente	<2
<i>Trichoderma virens</i> cepa QT 86	$2,0 \times 10^8$	Cadmio	<1,5
<i>Trichoderma harzianum</i> cepa QT 72	$1,0 \times 10^8$	Arsénico	<40
<i>Bacillus amyloliquefasciens</i> cepa QT 93	$1,0 \times 10^8$	Plomo	<120
<i>Bacillus subtilis</i> cepa QT 35	$2,0 \times 10^8$	Mercurio	<1
<i>Bacillus subtilis</i> cepa QT 38	$2,0 \times 10^8$	Níquel	<50
Coformulantes c.s.p.	98,0%	Cobre	<600
		Zinc	<1500
		<i>Escherichia coli</i>	Ausente
		<i>Salmonella</i> sp.	Ausente

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS:

pH dilución 10% (20°C): 5,36

Densidad (20°C): 1,012 g/L

Fabricante/Formulador: AGRO Q-TRAL SpA

Dirección: San Isidro P38, Quillota, Chile

Página web: www.aqt.cl

Contenido: 1 litro

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

USOS	DOSIS	OBSERVACIONES
Vid de mesa, vinífera, pisquera, arándanos, frutilla, frambuesa.	1,5 a 2 L/ha	Se sugiere una aspersión foliar durante floración, pinta y pre cosecha
Tomate, lechuga, ají, pimentón, brócoli, espinaca, zapallo italiano, camote, papa, sandía y melón.	1 - 2 L/ha	Aplicar en floración y pre cosecha, vía riego durante todo el período de crecimiento
	Solución al 10% en agua 100 mL/L	En almácigos inmersión de semillas y bandejas por 5 minutos. En caso de semillas secar a la sombra
	150 mL/100L	A la siembra y trasplantes en drench al cuello
Almendros, nogales, avellanos, durazneros, nectarinos, damascos, cerezos, kiwi, paltos, manzanos, perales, membrillos, limoneros, naranjos, pomelos, mandarinos y olivos.	1,5 a 2 L/ha	Aplicar vía foliar o al riego según necesidad de inoculación. Vía riego, dejar el producto en la zona de mayor desarrollo radicular.
Trigo, avena cebada y maíz.	Inmersión al 10% v/v	Inmersión de la semilla por 10 minutos antes de sembrar. Secar a la sombra
Flores de corte y ornamentales	150 mL/100 L 1 - 2 L/ha	Inmersión de estructuras de reproducción vegetativa por 5 minutos previo a plantación. Vía foliar durante floración y vía riego durante el crecimiento vegetativo en peaks de crecimiento radical.

MODO DE APLICACIÓN: agitar el envase antes de tomar la dosis a aplicar, agregar al estanque de fertirriego, el cual debe estar con agua hasta la mitad y con el agitador en funcionamiento, para asegurar la homogeneidad de la mezcla.

COMPATIBILIDAD: TRIBAC BIO es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común, pero no es compatible con productos clorados ni cúpricos.

FITOTOXICIDAD: no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

TIEMPO DE REINGRESO: sin restricción.

PRECAUCIONES: temperatura de almacenamiento entre 5 y 15°C. Conservar a la sombra, en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, su contenido debe ser utilizado completo.

DURACIÓN: 6 meses a contar de la fecha de fabricación.

ADVERTENCIAS: producto natural, no contaminante. No es corrosivo y puede ser aplicado con equipos convencionales. Usar una vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del producto. Evite el contacto con los ojos y piel.

NOTA AL COMPRADOR: el producto y su formulación ha sido realizada bajo estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos la concentración en los envases debidamente sellados. El almacenamiento y la aplicación, son de exclusiva responsabilidad del usuario.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA: AGRO Q-TRAL +56942472555/ +56979762095. En horarios de oficina.

BIOESTIMULANTE AUTORIZADO POR EL SAG PARA SU USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA