AGRO**Q-TRAL**

Protegiendo y estimulando la vida

VIGÍA SL

Bioestimulante microbiano

VIGÍA SL es un bioestimulante microbiano radicular y foliar, formulado en base a cepas nativas de *Trichoderma virens* y *Trichoderma harzianum*, en forma de conidias y micelios viables, que actúan promoviendo el equilibrio natural del suelo y mejorando las condiciones nutricionales de los cultivos.

Producto concentrado: 2 x 10^9 UFC/ml

Composición:	**UFC/ml**
Trichoderma harzianum cepa TH 15	1,0 x 10^9
Trichoderma virens cepa TV 32	8,0 x 10^9
Coformulantes c.s.p.	98,8%

Contaminante	**Valor (ppm)**
Cromo hexavalente	<2
Cadmio	<1,5
Arsénico	<40
Plomo	<120
Mercurio	<1
Níquel	<50
Cobre	<600
Zinc	<1500
Escherichia coli	Ausente
Salmonella sp.	Ausente

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS:
pH dilución 10% (20°C): 3,56
Densidad (20°C): 1,069 g/L

Fabricante/Formulador: AGRO Q-TRAL SpA
Dirección: San Isidro P38, Quillota, Chile
Página web: www.aqt.cl

Contenido: 1 litro

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

USOS	ZONA DE APLICACIÓN	DOSIS	OBSERVACIONES
Frutales	Radicular	1,5 a 2 L/ha	Aplicar al suelo vía riego o drenching 1 a 2 semanas previo al flash de crecimiento radicular o para mejorar las condiciones biológicas del suelo. Uso con temperaturas superiores a 15°C.
	Foliar	1,5 a 2 L/ha ó 150 a 200 cc/hl	Aplicar desde inicios de floración y previo al cierre de racimos en vides, resto de especies desde floración a cuaja, siempre mientras existan restos florares que permitan su colonización. Uso con temperaturas superiores a 15°C.
Hortalizas, ornamentales y cultivos	Radicular	1,5 a 2 L/ha	Aplicar vía riego posicionando el producto en la parte superior del suelo. Para inmersión o drench, aplicar 1,5 a 2%, sumergiendo las bandejas o asperjando sobre el pan de sustrato. Repetir igual dosis vía riego a los 20 días post plantación. Uso con temperaturas superiores a 15°C.
	Foliar	1,5 a 2 L/ha ó 150 a 200 cc/hl para mojamientos inferiores a 1.000 L	Asperjar en forma foliar procurando cubrir completamente el follaje, repetir la aplicación a los 7 días de aplicado para generar una cobertura biológica aérea. Uso con temperaturas superiores a 15°C.

MODO DE APLICACIÓN: agitar el envase antes de tomar la dosis a aplicar, agregar al estanque de fertirriego, el cual debe estar con agua hasta la mitad y con el agitador en funcionamiento, para asegurar la homogeneidad de la mezcla.
COMPATIBILIDAD: VIGÍA SL es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común, pero no es compatible con productos clorados ni cúpricos.
FITOTOXICIDAD: no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.
TIEMPO DE REINGRESO: sin restricción.
PRECAUCIONES: temperatura de almacenamiento entre 5 y 15°C. Conservar a la sombra, en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, su contenido debe ser utilizado completo.
DURACIÓN: 6 meses a contar de la fecha de fabricación.
ADVERTENCIAS: producto natural, no contaminante. No es corrosivo y puede ser aplicado con equipos convencionales. Usar una vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del producto. Evite el contacto con los ojos y piel.
NOTA AL COMPRADOR: el producto y su formulación ha sido realizada bajo estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos la concentración en los envases debidamente sellados. El almacenamiento y la aplicación, son de exclusiva responsabilidad del usuario.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: AGRO Q-TRAL +56942472555/ +56979762095. En horarios de oficina.

BIOESTIMULANTE AUTORIZADO POR EL SAG PARA SU USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA